



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## PICARDIE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°7 du 5 juin 2006 - 2 pages

### Mildiou

Surveillez attentivement l'environnement de vos parcelles et gérez les tas de déchets par bâchage ou traitement à la chaux.

#### Situation sanitaire

Comme nous le disions la semaine passée, les conditions climatiques fraîches ont ralenti le développement du mildiou. A la faveur de la remontée des températures en fin de semaine, on a constaté une explosion des symptômes sur tas de déchets (Cappy, Lamotte Warfusée).

Notre prospection montre que certains tas de déchets ne sont toujours pas gérés à ce jour. La pression de l'environnement est donc toujours potentiellement élevée.

#### Le coin des modèles

Les durées d'incubation ont été rallongées à une dizaine de jours comme prévu dans le dernier bulletin.

Ainsi, d'après Guntz-Divoux, les taches de la 5ème génération sont sorties entre le 2 et le 5 juin (au lieu du 1er juin initialement prévu). La 6ème génération est en cours d'incubation pour les postes de Forté, de Froidmont et de Marcelcave.

Situation épidémiologique poste par poste  
(d'après Guntz-Divoux et MILSOL)

Postes climatiques	Génération	Date prévue de sortie de tache	Potentiel de sporulation
Amiens	5	à partir du 2 juin	fort
Assainvillers	5	à partir du 3 juin	fort
Attilly	5	à partir du 5 juin	fort
Beines	6	à partir du 10 juin	fort
Bernaville (M F)	5	à partir du 6 juin	fort
Braine (M F)	4	à partir du 3 juin	fort
Ebouleau	5	à partir du 5 juin	fort
Epehy (M F)	5	à partir du 6 juin	moyen
Forté	6	à partir du 12 juin	fort
Froidmont	6	à partir du 12 juin	fort
Hérissart	5	à partir du 3 juin	fort
Inval (Abbeville)	5	à partir du 2 juin	fort
La Houssoye	5	à partir du 2 juin	fort
Marcelcave	5	à partir du 3 juin	fort
Marchais	6	à partir du 9 juin	fort
St Just en Chaussée	5	à partir du 2 juin	fort
Roye (Solente)	5	à partir du 3 juin	fort
Vauvillers	5	à partir du 3 juin	fort
Verdilly	5	à partir du 12 juin	fort
Vervins (M F)	4	à partir du 6 juin	fort
Vic sur Aisne	4	à partir du 3 juin	fort
Villeroi	5	à partir du 2 juin	moyen
Villiers le Sec	5	à partir du 2 juin	fort
Vron (M F)	5	à partir du 4 juin	fort

Mildiou : sortie  
de la 5ème  
génération  
voire 6ème  
génération en  
cours

GERER LES  
TAS DE  
DECHETS

Ministère  
de l'Agriculture  
Service Régional de la  
Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue  
518, rue St Fuscien  
80092 AMIENS  
CEDEX 3  
Tél : 03.22.33.55.97  
Fax : 03.22.33.55.56  
E-mail : srpv.draf-  
picardie@agriculture.gouv.fr  
Notre site : www.srpv-  
picardie.com

Bulletin réalisé avec la  
participation de la  
FREDON Picardie par  
délégation (art. L252-1 à  
L252-5 du Code Rural).

Imprimé à la station  
d'Avertissements  
Agricoles d'AMIENS  
Directeur gérant :  
Christophe MARTINET  
Publication périodique  
C.P.A.P. n°1823AD  
ISSN n°07576609

Tarif Courrier 65 €  
Tarif Fax 61 €  
Tarif E-mail 58 €

03 40 2000-3099

P146

La 4ème génération sort entre le 3 et le 6 juin sur les postes de Braine, Vervins et Vic sur Aisne.

Le modèle MILSOL signale des potentiels de sporulation forts sur quasiment tous les postes climatiques (cf tableau).

### Préconisations

➤ **Variétés résistantes sur les postes enregistrant une 4ème génération (Vervins, Braine et Vic sur Aisne) :**

*Pas d'intervention avant la semaine prochaine.*

➤ **Autres cas (variétés résistantes sur les autres postes, variétés intermédiaires et sensibles) :**

*Météo France prévoit une semaine ensoleillée. Toutefois, l'hygrométrie matinale peut être favorable à la contamination du mildiou.*

*Renouvelez votre intervention dès la fin de persistance d'action du fongicide.*

### Rappels produits :

Il faut souligner l'intérêt de certains produits ascendants à diffusion acropétale (EPERON, EPOK TRECATOL) et diffusant (ACROBAT MDG, TATTOOC, SERENO, EQUATION PRO) pendant la phase active de croissance du feuillage.

### Point Résistance :

Compte tenu des risques de développement de la résistance aux substances actives, une stratégie de gestion des risques doit être mise en place.

➤ Pour les spécialités contenant des phénylamines (EPOK, EPERON et TRECATOL) :

**- 2 traitements maximum par campagne**

- application en **PREVENTIF**, en l'absence de mildiou et en période de croissance active **au plus tard 5 juillet**.

L'intervalle entre deux traitements à la dose homologuée sera de 7 jours.

➤ Les spécialités contenant du propamocarbe ou du diméthomorphe (TATTOOC et ACROBAT MDG) n'ont pas montré jusque là de résistance. Un suivi est en place.

➤ Les spécialités à base de cyazofamid, la fénamidone et famoxadone (respectivement RANMAN, SERENO et EQUATION PRO) doivent être appliqués uniquement en préventif.

**Dans tous les cas, bien respecter les prescriptions de l'étiquette (dose, intervalle...), alterner les modes d'action dans un programme de traitement.**

## Doryphores

### Situation

Les premières larves ont été observées sur repousses en milieu de semaine passée dans le secteur de Laon et d'Amiens. Elles sont cette semaine au stade grain de blé. Une repousse sur 2 est infestée.

Pour le moment, on ne recense pas de populations en parcelles.

Les infestations se font généralement par foyers.

### Préconisations

**Pas d'intervention insecticide.**